

Label Details

Chemical Composition

S.No	Ingredient	Description	Weight
1	Fipronil	a.i.	40.00 % w/w
2	Imidacloprid	a.i.	40.00 % w/w
3	Sodium polycarboxylate		3.00 % w/w
4	Sodium Dioctyl sulfosuccinate 85%		2.00 % w/w
5	Non ionic aqueous emulsion of (30%) polydimethylsiloxane		0.30 % w/w
6	Sodium lignosulfonate sulfomethylated		QS %
Total			100 % w/w

Direction Of Use

Please read enclosed leaflet before use.

Precautions

The above mentioned symptoms must not be confused with organophosphorus compounds. There may be delayed neurological effects, including brain oedema.

CIR-236311/2022-Fipronil + Imidacloprid (WG) (442)-813

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG (Systemic and Contact Insecticide)

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्यूजी (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)



बच्चों की पहुँच से दूर रखें

Keep out of reach of children.

सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

Regn.No रजि. नं. _____

Mfg.Lic.No मैनयु ला. नं. _____

Batch No. बैच नं. _____

Mfg Date मैनयु, ता. _____

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	विवरण	वजन
1	फिप्रोनिल	सक्रिय तत्व	4.00 % भार/भार
2	इमिडाक्लोप्रिड	सक्रिय तत्व	40.00 % भार/भार
3	सोडियम पोलिकारबोक्सिलेट		3.00 % भार/भार
4	सोडियम डायोक्टिल सल्फोसक्सिनेट 85%□		2.00 % भार/भार
5	नॉन आयनिक एक्युअस इमलशन (30%) पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सेन		0.30 % भार/भार
6	सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटिड		पर्याप्त मात्रा %
कुल			100 % w/w

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें ।

Antidote

Specific antidote not known. Treat symptomatically.

First Aid

Please read enclosed leaflet before use.

Symptoms

Convulsions, tremors, anxiety, restlessness.

Recommendations

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is recommended for control of white grubs in Sugarcane and Groundnut.

Manufactured By

M/s Classic Chemicals.

Survey No. 281, plot No. 1,2 and 3, Shapar Village Road,

Manufacturer Premises Address

Survey No. 281, plot No. 1,2 and 3, Shapar Village Road,
At. Shapar, Dist. Rajkot, (Guj)-360024

Exp. Date	खत्म होने की _____ तारीख
Net Content / Volume	शुद्ध भार, _____ आयतन
Max. Retail Price	अधिकतम _____ खुदरा मूल्य

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां

उपरोक्त दिये गये लक्षणों और औरगेनोफास्फोरस कीटनाशकों के लक्षणों में भ्रम नहीं करना चाहिए। कुछ विलम्बित स्नायु सम्बन्धित व दिमागी इडिमा जैसे असर हो सकते हैं।

विष नाशक

कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

प्राथमिक चिकित्सा

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें ।

लक्षण

रेंठन, कंपकपी, घबराहट, बेचैनी।

उपयोग

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्यूजी का उपयोग गन्ना और मूंगफली में लगने वाले सफेद ग्रब की रोकथाम के लिए किया जाता है।

निर्माता

अंग्रेजी में लिखे अनुसार

आयात कर्ता का उत्पादन परिसर

अंग्रेजी में लिखे अनुसार

Safety Pictograms / सुरक्षा चित्रलेख
